

県内、カメムシ類発生注意報発令中！

カメムシは粒剤で防除！！

ホクコー

®は三井化学アグロ株の登録商標
農林水産省登録：第20807号

スタークル® 粒剤

地域別確認地点率（畦畔等 20 回すくい取り%、平年比）

種 類	中越地区	魚沼地区	新潟県全体
オオトゲシラホシカメムシ	高	やや高	やや高
アカヒゲホソミドリカスミカメ	並	並	やや低
アカスジカスミカメ	高	高	高

（7月前半の斑点米カメムシ類の畦畔等雑草地における確認状況：新潟県病害虫防除所調査より）



オオトゲシラホシカメムシ



アカヒゲホソミドリカスミカメ



アカスジカスミカメ

スタークル粒剤の散布時期

出穂期(穂が見え始めた頃)～出穂7日後まで
散布量: 3kg/10^ア (水田全面に均一散布)

	出穂予想	スタークル粒剤散布時期
平坦地	8月 6日頃	8月 6日 ~ 13日頃
山間地	8月 11日頃	8月 11日 ~ 18日頃

(品種: コシヒカリ BL・JA北魚沼稲作情報より)

☆田植時期にバラつきが大きいことから必ずほ場に出穂期を確認してください。

散布時の水管理

- ・ 散布時の水深は深い部分で5cm程度!
- ・ 田面が乾燥している状態や8cm以上の深水での処理は避けてください

水口・水尻はしっかり止める

散布後7日間は落水禁止
(自然落水は可)

出穂期を確認し、均一散布が重要です!

粒剤防除で斑点米発生ゼロに抑えよう!!

JA北魚沼

★ご不明な点は最寄りの営農センターまでお問い合わせください。