

## 遅れず中干し開始で品質向上!

世界最高水準の魚沼コシヒカリ生産に向け、遅れずに中干しを開始しましょう

### 今年の中干しは既に始まっている!

- 生育は順調で、既に中干し開始めやすの288本/m<sup>2</sup>に達してしているほ場が多く見られます
- 田植え時期に大きなバラツキがあるため、必ずほ場で茎数を確認し、遅れずに中干しを開始しましょう
- 良食味・高品質米の生産に向け、出穂1ヶ月前には中干しを終了しましょう（平場の出穂1ヶ月前は平年7月7日です）


既に中干しを開始しているほ場も多い!



#### 【中干し開始めやす】

50株植えの場合：1株の茎数が18本

60株植えの場合：1株の茎数が15本



茎数は、これも一本です!  
数えてみると意外と多いものです!

※詳しくは指導会資料、中干し開始めやす早見表[魚沼版]をご覧ください（農協営農センター、振興局ホームページ）

### スムーズな秋作業に向け、本格降雨前に溝切り!

- 秋のコンバイン作業で苦労しないよう、本格的降雨前に地耐力を確保しましょう（梅雨入り6月16日頃(気象庁発表)）
- やや早めでも本格的降雨の前に溝切りを実施し、地表面の水が排水できるようにしましょう（溝切り後でも間断灌水等の水管理徹底で茎数確保は可能です）

### ワキが大量発生! 一度落水で根の健全化!

- 今年は、ワキが非常に多く発生しており、中には葉が黄化しているほ場もあります
- ワキは根を傷めるため、一度落水し、ガス(ワキ)抜きをしてください

※ 山場や6月に入り田植えを実施したほ場でも田植え直後のほ場を除き実施してください



不明な点は農協営農センターまたは普及センターまでおたずねください。