


出穂1ヶ月前までに 「中干し終了」で品質向上！！

遅れず中干し実施で「出穂1ヶ月前までに中干し終了」「早期落水防止」「地耐力確保」

中干し終了が遅れると整粒歩合が低下する！

- 中干し終了が出穂時期に近づくほど整粒歩合が低下します
- 出穂1ヶ月前までには中干しを終了させましょう




【出穂1ヶ月前のめやす】

平場：7月7日(七夕頃)

山場：7月12日

※平場は広神山田(気象感応ほ)、山場は入広瀬穴沢(定点調査ほ)の過去5年平均

中干し終了が遅れると穂肥を吸う根を傷める！



(出典:農山漁村文化協会「イネの生長」)

- 適期中干しは、土中に酸素供給することでうわ根(よこ根)の発生を促進します

しかし！

- 「中干し終了の遅れ」や「強すぎる中干し」は、穂肥を吸う大切なうわ根を傷めてしまいます
- うわ根が傷めると穂肥を吸いにくくなり、品質・収量が低下します(猛暑では特に低下しやすい)
- 出穂1ヶ月前頃からの水不足は品質・収量に悪影響を与えるため、十分に水を与えられるようにしましょう

詳しい資料は中干し指導会資料(営農センター、振興局HP等)をご覧ください。携帯メール会員募集！営農センターへおたずねください。