


# 高温のため刈り遅れによる 胴割米に要注意！！

- コシヒカリの収穫時期となっていますが、**高温**が続いており、**籾水分の低下**が早い**ため、立毛胴割れが発生**しているほ場があります。
- 今年は収穫適期のめやすを積算温度950℃としておりますが、925℃程度で適期になるほ場があるなど登熟が早まる傾向です。
- 適期の期間は4日程度(積算温度で100℃程度)です。
- 収穫に必要な日数を加味し、**刈り遅れないよう注意**しましょう

※ 写真サンプルは全てH23年産北魚沼米です

## 高温で登熟が早まっている！

- 茎葉は青くても籾の登熟は**予想以上に早まっています**。
- 8月8日出穂のほ場が、9月13日現在で**収穫可能な状況**です。



**積算温度 912℃**  
 (9月13日現在、小出アマダステータによる積算温度)  
 【地区】藪神  
 【出穂】8月8日  
 【田植え】5月20日  
 ※ 田植えが5日程度遅くても、出穂は1日遅くなる程度です

## 胴割米が発生している！

- 高温の影響等のため、既に**胴割米**による格落ちが発生しています。
- 刈り遅れないよう**十分注意**しましょう。



胴割米は消費者に嫌われる

## 黄化率を確認し適期収穫！ (刈り遅れ防止)

→ **部分(上位3~4本目の1次枝梗に着生する2次枝梗籾)が黄化した時**が**収穫適期(黄化率85~90%)**です。

